

1. Optimierung und Intensivierung von **Reinigung** und **Desinfektion**. Halten Sie sich an angegebene Dosierungs- und Anwendungshinweise.

2. Durchführung einer konsequenten und planmäßigen **Schadnagerbekämpfung**. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schädlingsbefall im Betrieb vorliegt.

3. Durchführung einer frühzeitigen und effektiven **Käferbekämpfung**. Behandeln Sie vor und nach jeder Neubelegung gegen Käfer.

4. Funktionsfähige **Hygieneschleusen** einrichten und nutzen. Desinfizieren Sie vor jedem Eintritt Ihre Hände und Stiefel.

5. Dokumentation und Einschränkung von **Persönungsverkehr** auf dem Betrieb. Stellen Sie betriebsfremden Personen Schutzkleidung zur Verfügung.

6. Nutzung von separaten **Gerätschaften** für verschiedene Ställe bzw. Betriebe. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Ihre verwendeten Geräte.

7. Sichere und trockene Lagerung von **Futtermitteln** in geschlossenen Silos. Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Siloanlagen.

8. Sicherstellung eines hygienisch einwandfreien **Tränkwassers** im Stall. Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig die Tränkwasserleitungen.

9. Optimierung des **Tierkomforts** durch eine stressfreie Umgebung. Vermeiden Sie Überbelegung und achten Sie auf eine bestmögliche Einstreu.

10. Berücksichtigung der **Herkunft** gekaufter Tiere. Stellen Sie sicher, dass die Brüterei Salmonellen-Untersuchungen durchführt.



10 praktische Tipps zur Salmonellenvorbeugung

